

Silicea 二酸化ケイ素

総体的症状：純粋な燧石を粉碎してつくられた。特に小児の、吸収不良による栄養障害を生じる。神経に作用し、その羅病性 (susceptability) を高め、神経衰弱症状や、反応過多を引き起こす。骨と軟骨の疾患—カリエスと壊死、骨の軟化。外骨腫症。腺の肥大。頭が大きく、泉門が閉じていない、腹が膨れて熱く硬い、腺病質の、くる病の小児、歩き出すのが遅く、身体、特に脚がやせ衰えている。神経質にはい回る子ども、または母親の腕にすがりつく；走っている間に血色を失う。しつこい化膿；瘻孔；膿瘍。腺、細胞組織、皮膚の遅々とした不完全な炎症、その後の硬化。雑音、痛み、寒さに鋭いほど敏感—火を抱え込む、温かい服を何枚も重ねたがる、すき間風を嫌悪。悪液質で高齢の患者；色白で、皮膚の透けるような人。激しく、刺されるような痛み、耳、喉、潰瘍など限局性の痛み。すぐに疲れる傾向と、異常な発汗。運動中でも体熱が不足。痙攣、てんかん、発作前の寒け。出産間際の、消耗、過労に起因する、ヒステリー、麻痺、しつこい神経痛。栄養不良。発育遅滞。るいそう。勇氣、道德心、体力の不足。肉芽。硬化した、硬い、結節状の、光った、ガラスのような、圧痛のある、撃ち抜かれるような痛みを伴う癰痕。ケロイド。午前中のむくみ。癌。括約筋の収縮。**上行性の症状。**精神と肉体の衰弱。脳軟化。落ち着きがない、そわそわした、ほんのささいな音でびっくりする。体重のかかっている部位がしびれる。異物の排出。進行性脊髄癆。身体を二つに分けられ、左側は自分ではないかのような感覚。髪の毛があるかのような感覚；舌の上に、気管に。予防接種、石切り、体液の損失、損傷、捻挫、とげの悪影響。アルコール性の刺激物に過敏。脊椎損傷、特に脊椎を圧迫すると、離れた部位が痛む場合の神経疾患。太陽神経

叢から始まる痙攣、予防接種後の痙攣。てんかん、太陽神経叢における前兆が、胸と胃にはい上がる。不健康な皮膚；けがをすると必ず化膿する。臭い分泌物一膿、発汗、便など。

悪化：冷氣、すぎ間風、湿気。露出する、入浴。特に足の発汗の抑圧。神経の興奮。光。雑音。脊椎の振動。月の満ち欠け。夜。過度の頭脳労働。アルコール。接触。圧迫。天候の変化。髪をとかす。

好転：頭を温かく覆う。夏。湿った暖かい天候。多量の排尿。電磁気。

精神：従順、臆病。敏感、めそめそする。頑固。強情、石頭な子ども。やさしく話しかけられると泣く。固定観念；ピンのことばかり気にする、怖がる、探して数を数える。精神の鋭敏さ、肉体の衰弱と鈍さを伴う。不機嫌。ささいなことに良心の呵責を感じる。自信喪失；失敗を恐れる、しかし根拠がない。かすかな音に驚く。激しく叫ぶ、うめく、てんかんの際。宗教に無関心。希望がない。悲しみ。人生への嫌悪、身投げしたいと思う。精神疲労。自分自身を正確に表現できない。落ち着きがない。不安からの疾患。

頭部：めまい、背部から上昇する、＜見上げる、目を閉じる、左側を下にして横たわる。上昇性の後頭部の痛み、＞圧迫。周期的な頭痛。頭痛後、視覚喪失。頭頂がずきずきする。泉門が開いている、腹部の膨張を伴う。頭皮の瘤。頭痛＞多量の排尿。右側が麻痺したように感じる、＜性交。頭痛＜激しい活動、勉強、雑音、動作、振動、光、冷氣、会話、排便でいきむこと、そして＞温かく覆うこと、圧迫。頭皮の湿った痂皮のある発疹。頭皮と骨の間の、凝塊状の液体に満たされた腫脹。片頭痛。重疾患後の慢性的な頭痛。髪の手が抜ける、若はげ。

目：涙管周辺の眼角の疾患；涙管瘻の腫脹；涙小管の狭窄。斑点のある視界。色がうせて見える。日光を嫌悪、まぶしい。角膜炎一膿疱、穿孔性。目の炎症。前房蓄膿。天然痘後の角膜白濁（1か月間、30Cを投与）。足の発汗抑圧後の事務職員の白内障。麦粒腫；再発防止の

ために。まぶたの被包性腫瘍。読書すると字が重なって見える。

- 耳**：耳の中のとどろくような音。シーツという音。穴の開いた鼓膜。かゆみ。乳様突起のカリエス。難聴、爆音などがこだまする、または鼻をかむとき、咳をするときに音が反響する、＜満月。臭い分泌物。音に敏感。耳が詰まったような感覚、＞あくびをするとき、または嚥下時。耳の中の痂皮状の形成物。子どもは睡眠中に耳をほじる。
- 鼻**：泡状の鼻からの分泌物。コリーザ、鼻出血を伴う。鼻中隔の穿孔。乾燥した硬い痂皮、緩むと出血。朝のくしゃみ。先端のかゆみ。骨の痛み。鼻の乾燥、鼻づまり、嗅覚喪失。子どもの鼻出血。鼻孔の亀裂。耳の疾患を伴うしつこいかぜ。鼻かぜ。
- 顔**：青白い、悪液質、ろうのよう。耳下腺肥大。唇、顔の皮膚の亀裂。顎の発疹。顎下腺の腫脹。口角の亀裂の硬化。下唇の癌。
- 口**：舌の上に髪の毛があるような感覚。歯根の膿瘍。歯茎のできもの。膿漏。水がまずい、飲んだ後吐く。歯が折れる、エナメル質がはがれる、ざらざらになる、カリエス。茶色い舌。口に対して、歯が大きすぎる、長すぎるように感じられる。舌の片側の腫脹。
- 喉**：苦い。扁桃肥大、化膿。嚥下時に、食べ物が鼻から出る。扁桃のちくちくする痛み。臭い塊を咳払いで出す。嚥下が痛む、困難、ヒステリー性。
- 胃**：調理された食事、温かい食事、肉、母乳を嫌悪一吐き出す。アイスクリーム、氷水を好み、それが胃の中にあると心地よい。水がまずい、飲むとすぐに吐き出す。幽門の硬化。悪寒を伴う呑酸。むさぼり食うような食欲、食べようとするときと失せる、または食べ物を嫌悪。食後の酸っぱいおくび。酸っぱい嘔吐。みぞおちのかじられるような痛み、ねじれるような痛み、＜圧迫。まるで冷たい石が胃の中にあるように感じる。
- 腹部**：ずきずきする、肝臓周辺の潰瘍性の痛み。疝痛、切られるような痛みと黄色い手、青い爪。膨張し、硬く熱い、脚はやせている、特に

子どもの場合。切られるような、痙攣性の痛み、直腸から精巣にかけての、＜性交。便秘、＜月経前と月経中。軟便でもいきむ、極度の疲労を伴う。湿った肛門；臭い放屁。排出が困難な便、一部が外に出て、また引っ込む；痛みへの恐怖から出ない。腹壁の亀裂。肛門の裂溝、瘻孔、肺の症状を伴う。括約筋の有病性痙攣。極度に痛い痔、排便時に突出する。臭い下痢。無益な便意。慢性の下痢。臭い便、痛みがない、未消化物を含む。サナダムシ。乳を飲んだ後の下痢。ヘルニア性腫瘍、圧痛がある。腹水症、多大な滲出を伴う、頻繁な下痢を伴う。

泌尿器：多量の排尿、頭痛が好転する。しぶりを伴う頻繁な排尿。寄生虫に起因する子どもの夜尿。慢性尿道炎、尿道からの臭い分泌物、濃厚、凝乳状、膿状、血性。膿の混じった尿。頭を打って以来の夜ごとの失禁。腎結石、膀胱結石。

男性：臭い、淋病性の尿道口の分泌物。性交後、頭の左側に麻痺したような感覚。陰囊の湿った部位のかゆみ。精巣水腫。夜尿。性欲亢進または減退。前立腺漏、＜排便でいきむ。ねじられるような痛みを伴う慢性尿道炎。陰囊の象皮病。性交後の極度の疲労、平常に戻るまでに8～10日かかる。恥丘の痛い発疹。

女性：月経の増加に伴い、発作的に全身が氷のように冷たくなる。膣から上昇する痛み＜排尿。乳状の帯下、刺激性、ほとぼしる、＜排尿時。外陰部と膣のかゆみ、非常に敏感。血の混じった分泌物、＜授乳；月経間期の。じょうご状の陥没乳頭、痛む。乳房の硬い瘤、瘻孔。膣の漿液性嚢胞；外陰部の瘻孔と膿瘍。乳房が膿瘍になりやすい。硬性癌、かゆみを伴う。乳房と子宮の鋭い痛み。早い月経、微量。数か月に及ぶ無月経。胎児の激しすぎる動き。膣内または周辺の、瘻孔性の膿瘍または裂孔、濃厚な、乳状の分泌物を伴う。卵管炎、子宮から時折出てくる膿や血清がたまる。帯下に伴う、へそ周辺の切られるような痛み。月経の代償の水っぽい分泌物。衰弱に起

因する流産、自分では衰弱が原因とは考えない。性交中の吐き気。月経間期の血性の分泌物。不妊。女子色情症。外陰部のかゆみ。

呼吸器：吐き気を伴う、震える咳、＜冷たい飲み物、会話、目覚めた後も横たわっている。首にすぎ間風が当たることによる呼吸困難；慢性のかぜ、胸から始まり、喘息性の発作になる；過熱による、または激しい活動による。淋病性の（sycotic）喘息。多量の臭い、黄色い、塊のある痰；粒；壊れると臭い。かぜが治らない。肺炎からの治癒に時間がかかる。胸のガラガラいう音。胸から背中にかけての刺されるような痛み。肉体労働、速足などによる息切れ。石工の疾患。胸膜炎後の気腫。放置された肺炎。胸骨の痛みを伴わない拍動。

心臓：座っている間、または動いているときの、全身の拍動。動悸；座っているとき、手の震えを伴う。神経疲労に起因する心臓疾患。

首・背中：脊椎；衰弱、背中にすぎ間風が当たること非常に敏感。二分脊椎。脊椎カリエス。腰筋膿瘍。尾骨が痛む。乗り物に長時間乗っていたことによる背中の痛み。背中の灼熱感、戸外を歩いて身体が熱くなったとき。首のこわばり、頭痛を伴う。痛みを伴う脊柱後弯症。仙骨周辺の不自由さ。

四肢：腋窩腺の腫脹、肥大。手指先の痛み、紙でできたかのような乾燥、夜。氷のように冷たく汗ばんだ足。臭い足の汗、かゆい、刺激性、靴を傷める；抑圧された。土踏まずのひりひりする痛み。歪んだ、肉に食い込む、黄色い爪。足首と足が弱い。ふくらはぎの緊張と収縮。瘰癧、根深い痛み。手指の萎縮としびれ。体重のかかっている部位が無感覚になる。腱膜瘤。骨の炎症。何かをしようとしたときの手の震え。上腕が不自由。歩行中の脚の麻痺感、震え。踵の官能的なうずき。性交や射精後の全身の打撲のような痛み。膝のひきつり。手指の間の軟鶏眼。ざらざらした、黄色い、不具の、もろい、白い斑点のある、発熱時には青くなる爪。関節周辺の潰瘍、希薄な、臭い、血の混じった、膿状の分泌物、または凝乳状の小片を伴

う。だらしない歩き方。リウマチ、特に足の裏の、歩くことができない。ふくらはぎと足の裏のひきつき。膝蓋の滑液包の肥大。痙攣時の歪み。腕（左）がてんかんの前に震える。

皮膚：ねっとりした、しなびた。先端のとがった発疹。傷が突然痛くなる。ケロイド。どんな小さな傷も化膿する。らい性結節。銅色の斑点。癰。潰瘍；痛いほど敏感、臭い、海綿状、足の、足指の、爪の、>熱。関節の膿瘍。日中または夕方だけかゆい発疹。あらゆるところに、せつや膿疱ができる。潰瘍の冷たい感覚。いぼ状の増殖。バラ色の斑。象皮病。

睡眠：夢遊病。怖い夢で眠りが妨げられる。睡眠中、じっとしていない。みだらな夢、過去の出来事の夢。恐怖で、全身震えながら目覚める。大声で寝言を言う、ぶつぶつ言う、または笑う。激しいあくび。眠いが眠れない。爽快にならない睡眠。

熱：悪寒、<寝床に横たわる、激しい活動。痛む部位の冷たさ。氷のよ
うな冷たさ。多量の汗、上半身の、頭や患部の、夜間の、臭い、か
きやすい、刺激性の、眠ったとたん。消耗熱。

補完レメディー：Fl-ac., Phos., Thuj.

関連レメディー：Calc., Hep., Kali-p.

Solidago virgaurea アキノキリンソウ

総体的症状：腎臓の機能障害による疾患、または、それを合併した疾患には、このレメディーがよく作用する。消化管、下肢と血液に影響を与える。衰弱感；悪寒と熱が交互に現れる。出血。かぜをひきやすい。慢性腎炎。尿毒性喘息。

悪化：圧迫。

好転：多量の排尿。